RATICIDA PASTA FRESCA

FICHA TÉCNICA

20513

INTRODUCCIÓN

RATICIDA FLOWER PASTA FRESCA es un cebo de pasta fresca listo para su uso, activo frente a topos, ratas y ratones considerados "resistentes" a otros anticoagulantes. Los roedores son atraídos fácilmente debido a las características particulares del excipiente contenido en el cebo, una vez intoxicados, mueren lejos del lugar de consumo o bien en el fondo de sus madrigueras (a partir del tercer o cuarto día de la ingestión), sin agonía y sin despertar sospecha o alarma a sus congéneres. Actúa interfiriendo la producción de protombina en el hígado, aumentando el tiempo de coagulación de la sangres y alterando los capilares, produciéndose hemorragias fatales.
Debido a las características del cebo, puede utilizare tanto para desratizaciones genéricas como específicas (lugares húmedos, viviendas, depósitos, almacenes, etc…).
Es activo contra roedores resistentes a la Warfarina.

AUTORIZADO USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL

COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN
Bromadiolona, 0,005% *Amargante, 0,001%*	Cebo fresco (de 10g aprox) **Se presenta en:** Caja de 400 g (2 bolsas de 200 g)

PRINCIPALES APLICACIONES

Rodendicida general para el control de ratas, ratones y demás roedores.
De uso doméstico y ambiental.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Colocar los cebos en las proximidades de las madrigueras y zonas de tránsito de los roedores, en pequeños montones, protegidos de la lluvia y fuera del alcance de los niños. No tocar el cebo con la mano desnuda para evitar que los roedores rehúsen consumirlo. Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que el producto contamine los utensilios de cocina, los alimentos y sus envases, así como las superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.

Ratones: Dosificar de 25-50 g (1 a 2 cebos)
Ratas negras: Dosificar de 50-100 g (2 a 4 cebos)
Ratas grises: Dosificar de 100-200 g (4 a 8 cebos)

RECOMENDACIONES:

Durante la preparación y el manejo del cebo deberían utilizarse guantes. Reponer los cebos consumidos o deteriorados diariamente, durante al menos 10-15 días consecutivos. Los emplazamientos deben mantenerse llenos de cebo, hasta que haya desaparecido la actividad de los roedores, que se

observa porque el cebo permanece intacto. Controlados los roedores, es conveniente mantener una serie de emplazamientos para prevenir una inversión.

Rata negra

Rata gris

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

La intoxicación puede producir: La principal manifestación del envenamiento con anticoagulantes es la diátesis hemorrágica.

Primeros auxilios: retire a la persona de la zona contaminada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos; no olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabón. No administrar nada por vía oral. En caso de ingestión reciente (< 3 h), y si la persona está consciente, provoque el vómito. Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos: En caso de ingestión, descontaminación digestiva, según el estado de conciencia. Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.
Antídoto: vitamina K1.
Controle el tiempo de protombina.
Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Tel. 915 620 420.

ADVERTENCIAS AL USUARIO. Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología...). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

OBSERVACIONES

RATICIDA FLOWER PASTA FRESCA se trata de un **PLAGUICIDA de USO DOMÉSTICO,** por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.

Toxicología: **Xn - NOCIVO: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.** Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos. Usar guantes adecuados. En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico, mostrándole, si es posible, la etiqueta.